



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO S.E. 28 - 2025

Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ
Director de la Red Integrada de Salud Jaén

M.Cs. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES
Directora de Epidemiología

Equipo de Epidemiología

- * M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
- * Mag. Dwaygh Manuel León Sánchez
- * Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
- * Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
- * Lic. Merly Del Pilar Linares García



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.


El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la **Provincia de Jaén cuenta con una población de riesgo de 165960.**

En la **S.E. 28 - 2025**, se han notificado 63 casos de Dengue en la Prov. Jaén.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 5004 con una T.I.A. 301.5.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Seguridad.**

Canal Endémico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 28 - 2025



Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 28 - 2025


Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Señales Alarma		Dengue Con Señales Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados	Nº Fallecidos	Tasa de Letalidad	
			Casos	%	Casos	%	Casos	%				
Jaén	4644	440.0	4016	86	617	13.3	11	0.2	1225	26.4	3	0.07
Bellavista	188	151.6	152	81	36	19.1	0	0.0	7	3.7	0	0.0
Chontali	2	9.4	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Colasay	16	29.3	15	94	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pucara	45	63.3	41	91	3	6.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose del Alto	81	137.0	80	99	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	28	37.6	28	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Prov. Jaén	5004	301.5	4334	86.61	658	13.15	12	0.24	1232	24.62	3	0.1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

En la **S.E. 28 - 2025**, se ha notificado 304 febriles en la Prov. Jaén.

Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles Red Integrada de Salud Jaén, hasta S.E. 01 - 28 - 2025



En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 32.4%.

Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio - S.E. 01 - 28 - 2025


Grupo de Edad	Nº Casos	%	T.I.A x 1000 hab.
Menor de 01 año	998	6.3	272.9
1 a 4 años	2881	18.1	189.1
5 a 9 años	2679	16.8	143.2
10 a 19 años	3124	19.6	82.4
20 a 59 años	5158	32.4	48.0
Mayo igual a 60 años	1077	6.8	56.7
Total Febriles	15917	100	78.8

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria Leptospira interrogans que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINS/DGE – V.01, “Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias”, que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

En la **S.E. 28 - 2025**, se notificó 02 casos de Leptospirosis, 01 en el Distrito de Jaén y 01 en Bellavista de la Prov. Jaén.

Casos de Leptospirosis por Años Red Integrada de Salud Jaen Años 2021 - 2025 (S.E. 28)



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados de Leptospirosis es de 144 casos con una T.I.A. 7.13 y 200 casos probables.

Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 28 -2025

Provincia / Distritos	Leptospirosis		T.I.A. x 10,000 hab.
	Notificados en la S.E. 28	Casos Confirmados S.E. 01-28-2025	
Jaen	1	119	11.32
Bellavista	1	17	11.05
Chontali		1	0.98
Huabal		2	2.21
Pomahuaca		2	2.09
San Jose Alto		3	3.83
Total	2	144	7.13

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmaniasis. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.

Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

En la S.E. 28 - 2025, se notificó 01 caso de Leishmaniasis de los Distrito Colasay de la Prov. Jaén.



El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 34 casos con una T.I.A. 1.68.

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 28 - 2025

Provincia / Distritos	Leishmaniasis		T.I.A. x 10,000 hab.
	Notificados en la S.E. 28	Acumulado S.E. 01 - 28 - 2025	
Jaen		6	0.57
Chontali		11	10.83
Colasay	1	8	7.78
Pomahuaca		1	1.05
Sallique		7	9.34
Santa Rosa		1	0.98
Total	1	34	1.68


SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

En la S.E. 28 - 2025, en la Prov. Jaén se notificó 325 IRAS en niños menores de 05 años.

El acumulado de IRAS en menores de 05 años a nivel de la Prov. Jaén es de 7639 una T.I.A. 404.39.

En el canal endémico nos ubicamos es Zona de Seguridad.




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

En la S.E. 28 - 2025, se notificó 14 neumonías en niño en menores de 05 años, de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén, el acumulado es de 221 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 11.70.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en Zona de Epidemia.



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Parálisis Flácida:


En la S.E. 28 – 2025, se notificó 01 caso probable de Parálisis Flácida, en un niño de 06 años de edad, procedente del Distrito Pucara, Prov. Jaén.

Tos Ferina:

En la S.E. 28 – 2025, notificación negativa de tos ferina.


En la Provincia de Jaén, se tiene un acumulado de 17 casos notificados de Tos Ferina (14 confirmados y 03 probables).

Casos probables y confirmados de Tos Ferina, según inicio de síntomas Red Integrada de Salud Jaén, SE. 01-28-2025



El curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 47.1%.

Casos de Tos Ferina, por curso de vida Red Integrada de Salud Jaén SE. 01 - 28 - 2025




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

En la S.E. 28 – 2025, notificación negativa de COVID-19, en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.

Casos de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas en la Red Integrada de Salud Jaén, S.E.01 - 28 - 2025



Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio S.E. 01-28-2025


Provincia / Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	Nº Fallecidos
Prov. Jaén	18	0.09	3	1
Jaén	18	0.17	3	1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

En la S.E. 28 - 2025, notificación negativa de muertes fetales y neonatales de la Prov. Jaén.

Muertes Fetales y Neonatales por años Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio 2016 al 2025 (S.E. 01 - 28)



Muertes Fetales y Neonatales por Distrito Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 28 – 2025

Distritos	Muerte Fetal	Muerte Neonatal	Total Defunciones
Jaen	6	4	10
Bellavista	0	2	2
Chontali	1	0	1
Colasay	1	0	1
Pomahuaca	0	1	1
Sallique	2	0	2
Santa Rosa	1	0	1
Prov. Jaén	11	7	18



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MATRIS BABYS

Es una herramienta de análisis que cruza las variables de edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/ durante /después del parto), con el peso al nacer, en un marco de prioridades de intervención y evaluación de las mismas.

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	4	0	2	6
1500 - 2499 grs.	5	0	4	9
> 2500 gr.	2	0	1	3
TOTAL	11	0	7	18

Problemas derivados de:

- Nutrición, infecciones, alta paridad, o embarazo a temprana edad
- Pobre cuidado durante el embarazo
- Pobre cuidado y asistencia del parto, emergencias obstétricas
- Capacidad institucional de atención del RN, educación en cuidado RN

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	33.33			6
1500 - 2499 grs.	63.64	0.00	27.78	9
>2500 gr.				3
TOTAL	11	0	7	18

- En el año 2025 (S.E. 01 – 28), el 33.33% de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores a 1500 grs y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.).
- El 27.78% de las notificaciones corresponden a productos con bajo peso y peso normal, lo que estaría relacionado a los procesos de atención del RN, capacidad institucional y educación para el cuidado del RN en el hogar.
- Es de mucha importancia registrar el dato de momento de parto, de manera correcta, así como el peso.

PESO	MUERTE NEONATAL			TOTAL
	<24 Horas	1-7 Días	8-28 Días	
500 - 1499 grs.	0	2	0	2
1500 - 2499 grs.	1	3	0	4
>2500 grs.	0	1	0	1
TOTAL	1	6	0	7
PORCENTAJE	14.3	85.7	0.0	100

En el año 2025, hasta la S.E. 28, la mayor proporción de defunciones neonatales se registra en RN con 1 a 7 días de vida (85.7%).

Es necesario colocar correctamente la **Fecha/Hora** de nacimiento y de muerte, caso contrario no se puede determinar el tiempo de sobrevivencia.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

En la S.E. 28-2025, notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio 2016 - 2025 (S.E. 01-28)

Distritos	2021		2022		2023		2024			2025	
	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Incidenta	M.M. Directa	M.M. Indirecta						
Jaén					2			1			1
Bellavista										1	
Colasay											
Pomahuaca											
Pucara			1								
Chontali											
Sallique											
San Felipe	1										
San Jose del Alto											
Santa Rosa											
Prov. Jaén	3	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR:

El termino Violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación.

Hasta la S.E. 28-2025, en la Provincia de Jaén, podemos observar que los casos de violencia predominan en mujeres de edades entre 18 y 29 años (31.1%), donde el 30.5% cuenta con secundaria completa.

Características del agredido	Nº Casos	%
Sexo		
Masculino	21	12.8
Femenino	143	87.2
Curso de vida		
Niño (0-11)	19	11.6
Adolescente (12-17)	42	25.6
Joven (18-29)	51	31.1
Adulto (30-59)	46	28.0
Adulto mayor (60 a más)	6	3.7
Grado de instrucción		
Primaria incompleta	26	15.9
Primaria completa	20	12.2
Secundaria incompleta	40	24.4
Secundaria completa	50	30.5
Superior incompleta	9	5.5
Superior completa	15	9.1
Illetada	4	2.4



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


El tipo de violencia ejercido en ellas en su mayoría es la violencia psicológica con un 55.7% y física 26.0%, no existiendo motivo para sufrir este maltrato.

Características de la agresión	Nº Casos	%
Tipo de violencia		
Psicológica	131	55.7
Física	61	26.0
Sexual	37	15.7
Abandono	6	2.6
Motivo expresado		
Sin motivos	46	37.4
Celos	42	34.1
Otros	17	13.8
Economicos	16	13.0
Laborales	2	1.6

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ACCIDENTES TRANSITO:


Los Distritos donde se tiene la mayor ocurrencia de lesionados por accidentes de tránsito es el Distrito de Jaén con 85.5% (254), seguido de Bellavista con 5.72% (17).

Accidentes de Tránsito, por Distrito de ocurrencia
 Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 28 - 2025



Existen un numero de 76 lesionados que corresponden a varones y 37 lesionados que corresponden al sexo femenino ubicando el mayor porcentaje en el curso de vida adulto entre 30 y 59 años.

Accidentes de Tránsito, por curso de vida
 Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 28 - 2025



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ITS – VIH SIDA:


Desde el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, han transcurrido casi 3 décadas en las cuales se ha logrado avanzar en términos de prevención y atención de la población más afectada y vulnerable, sin embargo, esta continúa siendo un importante problema de salud pública, con una epidemiología compleja que plantea retos para un mayor conocimiento de su dinámica y para el diseño de intervenciones que permitan disminuir las brechas aún existentes en prevención y control de esta infección. Así

mismo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un importante cofactor que incrementa la probabilidad de transmisión del VIH, y cuyo abordaje en las políticas de salud es relevante

SIFILIS:

En la Provincia de Jaén, en la S.E. 28, no se han notificado casos de sífilis y gonorrea y en lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica ITS y VIH-SIDA se encuentran notificados un total de 19 casos de sífilis, los mismos que se encuentra siendo monitoreados por los establecimientos de salud notificantes.

Casos confirmados de Sífilis, por semanas epidemiológicas
 Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-28-2025




VIH – SIDA:

En la provincia de Jaén, en la S.E. 28, se ha notificado 1 caso de VIH.


En lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH– SIDA, han notificado un total de 32 casos confirmados, de los cuales 01 caso es diagnosticado como estadio SIDA.

Casos de VIH-SIDA, según semanas epidemiológicas
 Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-28-2025




DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RED INTEGRADA DE SALUD JAEN S.E. 28 - 2025



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Monitoreo de Notificación Oportuna Red Integrada Salud Jaén S.E. 28 - 2025



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

